



7.
  - a. Câncer de cólon direito
  - b. Colonoscopia.
  - c. 45 anos. Pesquisa de sangue oculto nas fezes
  - d. Tomografia computadorizada de tórax e abdome. Tratamento cirúrgico
  - e. Colectomia (direita) por via laparotômica e laparoscópica.

8.
  - a.

jejum

ringer simples 2000 ml para correr em 1h agora

ringer simples 500ml e.v a critério médico

analgesia (tramadol 100mg e.v. dil agora)

antiemético ( plasil ou bromoprida )

não prescrever atb

protetor gástrico ( ibp endovenoso)

sonda vesical demora

02 acessos calibrosos mínimo 18g

suplementação 02 3l/min inicialmente cateter nasal

monitorização na sala de emergências

solicitar vaga uti

- b. coledocolitíase residual. ultra-sonografia do abdome total, para avaliar dilatação das vias biliares ou coledocolitíase, não realizar t.c. nas primeiras 36-48h pois pode piorar disfunção renal

9.
  - a. Ultrassonografia de abdome e os achados são: Murphy ultrassonográfico, Paredes espessadas, Cálculo impactado no infundíbulo, Líquido perivesicular, Vesícula hiperdistendida.
  - b. Risco intermediário. Colectomia com colangiografia ou colangioRNM

10.
  - a. Bilirrubina total, creatinina e INR
  - b. Sim. Preenche os critérios de Milão